

## 《哈尔滨居民用药行为风险 KAP 调查问卷》

您好！非常感谢您参与中国居民用药行为风险 KAP 调查！本次调查为匿名性质，您的回答仅供研究者进行统计分析，回答无对错之分。您的参与将会对促进我国公众安全用药提供非常有意义的帮助。感谢您的大力支持！

-----

### 基本信息

☺ 在回答之前，请您填写以下信息（请在序号上画“√”）：

☞ 您的性别：

男       女

☞ 您的年龄：

19-34 岁       35-49 岁       50-64 岁       65 岁以上

☞ 您的月收入：

1000 元以下       1000-2000 元       2000-4000 元  
 4000-6000 元       6000 元以上

☞ 您的居住地：

城镇居民       农村居民

☞ 您的医疗保障状况：

社会基本医疗保险       商业保险       自费医疗  
 公费医疗       其它

☞ 您的受教育程度：

研究生       本科       大专  
 中专或高中       初中       小学

☞ 您的工作状况：

在职       离退休       无/失业

☞ 您的职业：

企业工人       公司职员       机关干部  
 医疗机构       教师       企业经营管理  
 自由职业       学生       其它

下面每个问题(Q)包含了您对药品及药品使用的看法与观点，将其赞同程度用数字来量化，例如：1 代表极不赞同；2 代表不赞同，但程度不太大；依次类推；5 代表极为赞同，数字

越大表示赞同程度越高，每个题项均需给定您所认同的相应数字。您需要在同意程度的数字

下面画“√”。

**Q1、下列每个问题包含了对药品及药品使用的各种看法与观点，您是否赞同这些观点？**

极不赞同 不赞同 一般 赞同 极为赞同  
/不清楚

	极不赞同	不赞同	一般	赞同	极为赞同
01. 生病了应该尽量打针、挂水	1	2	3	4	5
02. 打针、挂水等注射剂药品比口服药品更安全	1	2	3	4	5
03. 越贵的药品越安全	1	2	3	4	5
04. 越贵的药品越有效	1	2	3	4	5
05. 用药的品种越多疗效越好	1	2	3	4	5
06. 用药的疗程越长越好	1	2	3	4	5
07. 身体稍有不舒服就应该立即用药	1	2	3	4	5
08. 保健品就是药品	1	2	3	4	5
09. 吃过保健品可以减少药品的用量	1	2	3	4	5
10. 口服药可以用牛奶、咖啡或饮料送服	1	2	3	4	5
11. 营养保健品可以和药品同时服用	1	2	3	4	5
12. 在医院输液时可以自行缩短输液时间	1	2	3	4	5
13. 抗菌药物可以治好任何一种感冒发烧	1	2	3	4	5
14. 抗菌药物可以杀死任何细菌和病毒	1	2	3	4	5
15. 只要自己不滥用抗菌药，就不会产生耐药性	1	2	3	4	5
16. 同时服用的抗菌药物种类越多，病就好得越快	1	2	3	4	5
17. 抗菌药就是消炎药	1	2	3	4	5
18. 服用非处方药不会有任何不良反应	1	2	3	4	5
19. 用不完的药品应该尽可能储存在冰箱里	1	2	3	4	5
20. 自我感觉症状减轻时可以停用药品	1	2	3	4	5
21. 自我感觉症状减轻时可以减少药品的剂量	1	2	3	4	5
22. 自我感觉症状加重时可以增加药品的剂量	1	2	3	4	5
23. 自我感觉症状加重时可以更换药品的种类	1	2	3	4	5
24. 新药的疗效和安全性肯定好于老药	1	2	3	4	5
25. 当周围的人感冒发烧或生其他病时，可以服用抗菌药进	1	2	3	4	5

行预防

- |                        |   |   |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|---|
| 26. 购药时应看品牌和名气判断药品质量好坏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27. 所有的药品都可以在常温下保存     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

☺说明：在表示行为或活动的频率数字下面画“√”，数字越大表示频率越大

**Q<sub>2</sub>、以下描述的是您使用药品过程中的一些行为，请圈出这些行为实际发生的频率**

- | <b>q1 使用药物前存在以下问题吗？</b>    | 从不 | 偶尔 | 时常   | 经常 | 总是 |
|----------------------------|----|----|------|----|----|
|                            |    |    | /不清楚 |    |    |
| 29. 根据自己的经验或是广告的宣传自行购买药品   | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |
| 30. 看病时，向医生点名要开某种药品        | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |
| 31. 在药店购买药品时听信营业员的建议       | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |
| 32. 持医生处方去药店购买处方药          | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |
| 33. 对家里存放的药品进行定期检查         | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |
| 34. 将药品摆放在小孩容易触及的地方        | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |
| 35. 观察说明书中药品储存的条件          | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |
| 36. 看一下药品副作用以及出现副作用后的表现    | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |
| 37. 了解使用某个药物时的禁忌事项（喝酒、驾驶等） | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |
| 38. 服用药品前观察药品有效期           | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |
| 39. 在服用药品之前查阅药品包装上的药品批准文号  | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |
| <b>q2 服用药物时存在以下问题吗？</b>    | 从不 | 偶尔 | 时常   | 经常 | 总是 |
|                            |    |    | /不清楚 |    |    |
| 40. 将家里过期的药品丢弃在垃圾箱里        | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |
| 41. 服用药品期间忘记使用药品           | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |
| 42. 孩子不肯服药，捏着他（她）的鼻子灌药     | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |
| 43. 服用已经超过有效期的药品           | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |
| 44. 将药物与牛奶、茶水或者咖啡同时服用      | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |
| 45. 用药时，每次都会考虑自身身体状况       | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |
| 46. 为增加疗效或症状加重的时候擅自加大给药剂量  | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |
| 47. 不注意药物的服用时间间隔           | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |
| 48. 服药几天后，感觉没效果擅自更换药物      | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  |

49. 病情好转以后，自行减少剂量或停药	1	2	3	4	5
50. 吃西药的同时擅自选择中药服用	1	2	3	4	5
51. 把药片掰开或是研碎后再吃	1	2	3	4	5
52. 没有在医师或药师指导下，您会将好几种药物混着吃	1	2	3	4	5

**Q<sub>3</sub>、**以下描述的是您可能接触过的用药知识讲座或用药教育活动，请圈出您实际接触或开展这些活动的频率

	从不	偶尔	时常	经常	总是
					/不清楚
53. 在我居住的小区听社区合理用药知识的讲座	1	2	3	4	5
54. 在医院或社区卫生服务中心听合理用药知识讲座	1	2	3	4	5
55. 阅读社区居委会发放的合理用药的宣传材料	1	2	3	4	5
56. 药师社区或街头咨询服务	1	2	3	4	5
57. 阅读医院或社区卫生服务中心发放的合理用药的宣传材料	1	2	3	4	5
58. 通过网络、微信等阅读合理用药知识的宣传资料	1	2	3	4	5

**Q<sub>4</sub>、**如果您接触过上述各种形式的合理用药知识的教育活动，您对开展这些活动的必要性看法如何？

	极无必要	没必要	一般	有必要	极有必要
					/不清楚
59. 社区合理用药知识讲座	1	2	3	4	5
60. 医院或社区卫生服务中心合理用药知识讲座	1	2	3	4	5
61. 社区居委会发放合理用药的宣传材料	1	2	3	4	5
62. 医院或社区卫生服务中心的合理用药宣传材料	1	2	3	4	5
63. 通过网络、微信等传播合理用药知识的宣传资料	1	2	3	4	5