

世界华人消化杂志®

**WORLD CHINESE
JOURNAL OF DIGESTOLOGY**

Shijie Huaren Xiaohua Zazhi

2024 年 4 月 28 日 第 32 卷 第 4 期 (Volume 32 Number 4)



4/2024

ISSN 1009-3079



《世界华人消化杂志》是一本高质量的同行评议、开放获取和在线出版的学术刊物。本刊被国际检索系统《化学文摘(Chemical Abstracts, CA)》、《医学文摘库/医学文摘(EMBASE/Excerpta Medica, EM)》、《文摘杂志(Abstract Journal, AJ)》、Scopus、《中文科技期刊数据库(CSTJ)》和《超星期刊域出版平台(Superstar Journals Database)》数据库收录。



目次

2024年4月28日 第32卷 第4期 (总第744期)

述评

- 243 乳酸及乳酸化修饰在NAFLD中的研究进展
陈治非, 张靓, 费书珂
- 248 脾肿大在门静脉高压症外科中的地位
董伟, 褚海波
- 254 新冠疫情防控下手足口病肠道病毒的流行特征及变迁趋势
王春荣

临床研究

- 261 基于倾向性匹配的胆汁反流对胃黏膜影响及CDX2表达分析
季怡帆, 楼晓军

文献综述

- 267 巴雷特食管: 当前面临的挑战
劳上洪, 黄纪乐, 吴灵飞
- 276 肝性脊髓病的中医诊治进展
刘雯, 沈美龙, 胡秋红, 马慧慧
- 280 肠道菌群失调与疾病关系概述
王可洋, 钟雪晴

临床实践

- 285 胃癌根治术围术期血清IL-6、HBP、T淋巴亚群水平变化及预测院内感染的价值分析
毛莉莉, 孙艳, 姜文兰
- 293 HBV相关肝病患者外周血T细胞及细胞因子水平研究
刘晨瑞, 李亚萍, 王怡恺, 张雯, 郝苗, 王文俊, 李婷, 党双锁

基础研究

- 302 长链非编码RNA LINC00996通过抑制CDKN2A促进胃癌进展
程国雄, 刘明, 陈正伟, 叶巧萍

消 息

- 266 《世界华人消化杂志》正文要求
275 《代谢相关脂肪性肝病肝外并发症》书讯
284 《世界华人消化杂志》性质、刊登内容及目标
292 《世界华人消化杂志》外文字符标准

封面故事

本刊编委陈可冀, 中国科学院院士, 教授, 主任医师, 中国中医科学院西苑医院. 中国医学科学院及中国中医科学院学部委员, 国家卫生健康委科技创新战略顾问, 中央保健委员会专家顾问组成员, 世界中医药学会联合会高级专家顾问委员会主席, 国家中医心血管病临床医学研究中心主任, 《中国中西医结合杂志》及*Chinese Journal of Integrative Medicine*杂志主编. 曾任中国科学院生物学部副主任, 世界卫生组织传统医学顾问. 首届立夫中医药学术奖; 国家科技进步奖一等奖, 二等奖; 全国杰出专业技术人才; 清宫医案配方集成获中国出版政府奖等奖项.

本期责任人

编务 吴云晓健; 送审编辑 张砚梁; 组版编辑 张砚梁; 英文编辑 王天奇;
形式规范审核编辑部主任 郭旭; 最终清样审核总编辑 马连生

世界华人消化杂志

Shijie Huaren Xiaohua Zazhi

吴阶平 题写封面刊名

陈可冀 题写版权刊名

(月刊)

创 刊 1993-01-15

改 刊 1998-01-25

出 版 2024-04-28

原刊名 新消化病学杂志

期刊名称

世界华人消化杂志

国际标准连续出版物号

ISSN 1009-3079 (print) ISSN 2219-2859 (online)

共同主编

党双锁, 博士, 教授, 研究员, 主任医师, 710004, 陕西省西安市, 西安交通大学医学院第二附属医院感染科

郭晓钟, 博士, 教授, 110840, 辽宁省沈阳市, 北部战区总医院消化内科

霍丽娟, 博士, 主任医师, 030001, 山西省太原市, 山西医科大学第一医院消化内科

江学良, 博士, 教授, 250001, 山东省济南市, 山东中医药大学第二附属医院消化中心

田艳涛, 博士, 教授, 主任医师, 100021, 北京市, 国

家癌症中心/中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院胰胃外科

王小众, 博士, 教授, 350001, 福建省福州市, 福建医科大学附属协和医院消化内科

姚登福, 博士, 教授, 226001, 江苏省南通市, 南通大学附属医院临床医学研究中心

张宗明, 博士, 教授, 100073, 北京市, 首都医科大学北京电力医院普外科

编辑委员会

编辑委员会成员在线名单, 详见:

<https://www.wjgnet.com/1009-3079/editorialboard.htm>

编辑部

王金磊, 主任

《世界华人消化杂志》编辑部

Baishideng Publishing Group Inc

7041 Koll Center Parkway, Suite 160, Pleasanton, CA 94566, USA

Telephone: +1-925-3991568

E-mail: wcjd@wjgnet.com

<http://www.wjgnet.com>

出版

百世登出版集团有限公司

Baishideng Publishing Group Inc

7041 Koll Center Parkway, Suite 160, Pleasanton, CA 94566, USA

Telephone: +1-925-3991568

E-mail: bpgoffice@wjgnet.com

<https://www.wjgnet.com>

制作

北京百世登生物医学科技有限公司
100025, 北京市朝阳区东四环中路
62号, 远洋国际中心D座903室
电话: +86-10-85381901

《世界华人消化杂志》是一本高质量的同行评议, 开放获取和在线出版的学术刊物. 本刊被国际检索系统《化学文摘(Chemical Abstracts, CA)》、《医学文摘库/医学文摘(EMBASE/Excerpta Medica, EM)》、《文摘杂志(Abstract Journal, AJ)》、Scopus、《中文科技期刊数据库(CSTJ)》和《超星期刊域出版平台(Superstar Journals Database)》数据库收录.

《世界华人消化杂志》正式开通了在线办公系统(<https://www.baishideng.com>), 所有办公流程一律可以在线进行, 包括投稿、审稿、编辑、审读, 以及作者、读者和编者之间的信息反馈交流.

特别声明

本刊刊出的所有文章不代表本刊编辑部和本刊编委会的观点, 除非特别声明. 本刊如有印装质量问题, 请向本刊编辑部调换.

定价

每期136.00元 全年12期1632.00元

© 2024 Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved.

Contents

Volume 32 Number 4 April 28, 2024

EDITORIAL

- 243 Role of lactic acid and lactylation in nonalcoholic fatty liver disease
Chen ZF, Zhang L, Fei SK
- 248 Role of splenomegaly in surgical treatment of portal hypertension
Dong W, Chu HB
- 254 Epidemic characteristics and changing trend of enterovirus infections in the context of prevention and control of COVID-19 epidemic
Wang CR

CLINICAL RESEARCH

- 261 Effect of bile reflux on the gastric mucosa and expression of caudal type homeobox 2: A propensity score analysis
Ji YF, Lou XJ

REVIEW

- 267 Barrett's esophagus: Current challenges in diagnosis and treatment
Lao SH, Huang JL, Wu LF
- 276 Progress in traditional Chinese medicine diagnosis and treatment of hepatic myelopathy
Liu W, Shen ML, Hu QH, Ma HH
- 280 Overview of relationship between intestinal flora imbalance and diseases
Wang KY, Zhong XQ

CLINICAL PRACTICE

- 285 Value of changes in perioperative serum interleukin-6, heparin-binding protein, and T-lymphocyte subpopulations in predicting nosocomial infections in radical gastric cancer surgery
Mao LL, Sun Y, Jiang WL
- 293 Peripheral blood T cell and cytokine levels in HBV-related liver disease patients
Liu CR, Li YP, Wang YK, Zhang W, Hao M, Wang WJ, Li T, Dang SL

BASIC RESEARCH

- 302 Long non-coding RNA LINC00996 promotes gastric cancer progression by inhibiting CDKN2A
Cheng GX, Liu M, Chen ZW, Ye QP

Contents

World Chinese Journal of Digestology
Volume 32 Number 4 April 28, 2024

COVER

Editorial Board Member of *World Chinese Journal of Digestology*, Ke-Ji Chen, Professor, Chief Physician, Academician of The China Academy of Science, Xiyuan Hospital, China Academy of Chinese Medical Sciences, No. 1 Xiyuan playground, Haidian District, Beijing 100091, China. kjchenvip@163.com

Indexed/Abstracted by

Chemical Abstracts, EMBASE/Excerpta Medica, Abstract Journals, Scopus, CSTJ and Superstar Journals Database.

RESPONSIBLE EDITORS FOR THIS ISSUE

Assistant Editor: *Yun-Xiaojuan Wu*

Review Editor: *Yan-Liang Zhang*

Production Editor: *Yan-Liang Zhang*

English Language Editor: *Tian-Qi Wang*

Proof Editor: *Xu Guo*

Layout Reviewer: *Lian-Sheng Ma*

Shijie Huaren Xiaohua Zazhi

Founded on January 15, 1993

Renamed on January 25, 1998

Publication date April 28, 2024

NAME OF JOURNAL

World Chinese Journal of Digestology

ISSN

ISSN 1009-3079 (print) ISSN 2219-2859 (online)

CO-EDITORS-IN-CHIEF

Shuang-Suo Dang, Professor, Department of Infectious Diseases, The Second Affiliated Hospital of Medical School of Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710004, Shaanxi Province, China

Xiao-Zhong Guo, Professor, Department of Gastroenterology, North Theater General Hospital, Shenyang 110840, Liaoning Province, China

Li-Juan Huo, Chief Physician, Department of Gastroenterology, The First Hospital of Shanxi Medical University, Taiyuan 030001, Shanxi Province, China

Xue-Liang Jiang, Professor, Digestive Center of The Second Affiliated Hospital of Shandong University of Traditional Chinese Medicine, Jinan 250001, Shandong Province, China

Yan-Tao Tian, Professor, Chief Physician, National Cancer Center/Department of Pancreatic and Gastric Surgery, Cancer Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing

100021, China

Xiao-Zhong Wang, Professor, Department of Gastroenterology, Union Hospital, Fujian Medical University, Fuzhou 350001, Fujian Province, China

Deng-Fu Yao, Professor, Clinical Research Center, Affiliated Hospital of Nantong University, Nantong 226001, Jiangsu Province, China

Zong-Ming Zhang, Professor, Department of General Surgery, Beijing Electric Power Hospital, Capital Medical University, Beijing 100073, China

EDITORIAL BOARD MEMBERS

All editorial board members resources online at <https://www.wjgnet.com/1009-3079/editorialboard.htm>

EDITORIAL OFFICE

Jin-Lei Wang, Director

World Chinese Journal of Digestology

Baishideng Publishing Group Inc

7041 Koll Center Parkway, Suite 160, Pleasanton, CA 94566, USA

Telephone: +1-925-3991568

E-mail: wjcd@wjgnet.com

<https://www.wjgnet.com>

PUBLISHER

Baishideng Publishing Group Inc

7041 Koll Center Parkway, Suite 160, Pleasanton, CA 94566, USA

Telephone: +1-925-3991568

E-mail: bpgoffice@wjgnet.com

<https://www.wjgnet.com>

PRODUCTION CENTER

Beijing Baishideng BioMed Scientific Co., Limited Room 903, Building D, Ocean International Center, No. 62 Dongsihuan Zhonglu, Chaoyang District, Beijing 100025, China
Telephone: +86-10-85381901

PRINT SUBSCRIPTION

RMB 136 Yuan for each issue

RMB 1632 Yuan for one year

COPYRIGHT

© 2024 Baishideng Publishing Group Inc. Articles published by this open access journal are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-commercial License, which permits use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, the use is non commercial and is otherwise in compliance with the license.

SPECIAL STATEMENT

All articles published in journals owned by the Baishideng Publishing Group (BPG) represent the views and opinions of their authors, but not the views, opinions or policies of the BPG, except where otherwise explicitly indicated.

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

Full instructions are available online at <https://www.wjgnet.com/1009-3079/Nav/36>. If you do not have web access, please contact the editorial office.

长链非编码RNA LINC00996通过抑制CDKN2A促进胃癌进展

程国雄, 刘明, 陈正伟, 叶巧萍

程国雄, 刘明, 陈正伟, 叶巧萍, 丽水市人民医院胃肠外科 浙江省丽水市 323000

程国雄, 本科, 副主任医师, 研究方向为胃肠道肿瘤外科综合治疗的临床和基础研究.

基金项目: 丽水市科技计划项目, No. 2020SJZC037.

作者贡献分布: 此课题由程国雄及刘明设计; 临床标本的获取由程国雄及陈正伟完成; 体外细胞实验和分子生物学实验由程国雄、陈正伟及叶巧萍完成; 统计学分析由叶巧萍完成; 本论文的写作由程国雄、叶巧萍及刘明完成.

通讯作者: 程国雄, 本科, 副主任医师, 323000, 浙江省丽水市丽阳街1188号, 丽水市人民医院胃肠外科. jiemengqn52403@163.com

收稿日期: 2024-03-05

修回日期: 2024-04-07

接受日期: 2024-04-15

在线出版日期: 2024-04-28

Long non-coding RNA LINC00996 promotes gastric cancer progression by inhibiting CDKN2A

Guo-Xiong Cheng, Ming Liu, Zheng-Wei Chen, Qiao-Ping Ye

Guo-Xiong Cheng, Ming Liu, Zheng-Wei Chen, Qiao-Ping Ye, Department of Gastroenterology, Lishui People's Hospital, Lishui 323000, Zhejiang Province, China

Supported by: Science and Technology Program of Lishui City, No. 2020SJZC037.

Corresponding author: Guo-Xiong Cheng, Bachelor, Deputy Chief Physician, Department of Gastrointestinal Surgery, Lishui People's Hospital, No. 1188 Liyang Street, Lishui 323000, Zhejiang Province, China. jiemengqn52403@163.com

Received: 2024-03-05

Revised: 2024-04-07

Accepted: 2024-04-15

Published online: 2024-04-28

Abstract

BACKGROUND

The expression and function of the long chain noncoding RNA (lncRNA) long intergenic non-protein coding RNA 996 (LINC00996) in gastric cancer remain elusive, despite its established pro- or anti-tumor roles across various tumor types.

AIM

To investigate the expression of LINC00996 in gastric cancer tissues and cell lines, and to explore its role and underlying mechanism in the biological behavior of gastric cancer cells.

METHODS

Bioinformatics was used to analyze the expression of LINC00996 in gastric cancer and its effect on the overall survival of patients with gastric cancer. The expression of LINC00996 in gastric cancer and adjacent tissues as well as gastric cancer and normal gastric epithelial cell lines was detected by RT-qPCR. Gastric cancer cells (SGC7901 and NCI-N87) were transfected with small interfering RNA targeting LINC00996 (si-LINC00996) and cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (CDKN2A)(si-CDKN2A), and cell proliferation, cell cycle progression, apoptosis, migration, and invasion were detected by cell counting kit-8, EDU staining, flow cytometry, scratch assay, and Transwell assay, respectively. The expression of CDKN2A, cyclin D1, B-cell lymphoma-2 (Bcl-2), Bcl-2 associated X protein (Bax), and cleaved cysteinyl aspartate-specific proteinase-3 (caspase-3) was detected by Western blot.

RESULTS

The expression of LINC00996 in gastric cancer tissues and cells was significantly higher than that in adjacent tissues and normal gastric cell lines ($P < 0.05$). Survival analysis based on the Kaplan-Meier Plotter database showed that

the overall survival of gastric cancer patients with high expression of LINC00996 was significantly shorter than that of patients with low expression ($P < 0.05$). Knockdown of LINC00996 inhibited the proliferation, cell cycle progression, migration, and invasion of gastric cancer cells ($P < 0.05$), promoted apoptosis ($P < 0.05$), decreased the expression of cyclin D1 and Bcl-2 ($P < 0.05$), and increased the expression of CDKN2A, Bax, and cleaved caspase-3 ($P < 0.05$). Knockdown of CDKN2A partially reversed the effect of LINC00996 knockdown on gastric cancer cells ($P < 0.05$).

CONCLUSION

Knockdown of LINC00996 can induce apoptosis of gastric cancer cells and inhibit their proliferation, migration, and invasion by up-regulating CDKN2A expression.

© The Author(s) 2024. Published by Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved.

Key Words: Long intergenic non-protein coding RNA 996; Cyclin-dependent kinase inhibitory protein 2A; Gastric cancer; Proliferation; Apoptosis; Migration; Invasion

Citation: Cheng GX, Liu M, Chen ZW, Ye QP. Long non-coding RNA LINC00996 promotes gastric cancer progression by inhibiting CDKN2A. *Shijie Huaren Xiaohua Zazhi* 2024; 32(4): 302-312

URL: <https://www.wjgnet.com/1009-3079/full/v32/i4/302.htm>

DOI: <https://dx.doi.org/10.11569/wjcd.v32.i4.302>

摘要

背景

长链非编码RNA长基因间非蛋白编码RNA 996(long intergenic non-protein coding RNA 996, LINC00996)在多种肿瘤中发挥促癌或抑癌作用, 而其在胃癌中的表达和作用尚不清楚。

目的

探索LINC00996在胃癌组织和细胞系中的表达, 并探讨其对胃癌细胞生物学行为的作用及机制。

方法

用生物信息学法分析胃癌中LINC00996的表达, 及其对胃癌患者总生存期的影响。用RT-qPCR检测胃癌及癌旁组织、胃癌及正常胃上皮细胞系中LINC00996表达。胃癌细胞(SGC7901、NCI-N87)转染针对LINC00996的小干扰RNA(si-LINC00996)和细胞周期蛋白依赖性激酶抑制蛋白2A(cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, CDKN2A)的小干扰RNA(si-CDKN2A)后, 用细胞计数试剂盒-8法、EDU染色法、流式细胞术法、划痕法和Transwell法分别检测细胞增殖、细胞周期、凋亡、迁移与侵袭; Western blot法检测细胞中CDKN2A、周期蛋白D1、B淋巴细胞瘤-2(B-cell lymphoma-2, Bcl-2)、Bcl-2相关X蛋白(Bcl-2 associated X protein, Bax)和劈开的半胱氨酸蛋白酶-3(Cleaved

cysteinyl aspartate-specific proteinase-3, Cleaved caspase-3)表达。

结果

LINC00996在胃癌组织和细胞中表达较癌旁组织和胃正常细胞系显著升高($P < 0.05$), Kaplan Meier Plotter数据库显示LINC00996高表达组的胃癌患者的总生存期较低表达组显著缩短($P < 0.05$)。敲降LINC00996能抑制胃癌细胞增殖、细胞周期运行、迁移、侵袭($P < 0.05$), 促进细胞凋亡($P < 0.05$); 降低cyclin D1和Bcl-2表达($P < 0.05$); 升高CDKN2A、Bax和Cleaved caspase-3表达($P < 0.05$)。敲降CDKN2A能部分逆转敲降LINC00996对胃癌细胞的作用($P < 0.05$)。

结论

敲降LINC00996能通过上调CDKN2A诱导胃癌细胞凋亡, 抑制其增殖、迁移与侵袭。

© The Author(s) 2024. Published by Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved.

关键词: 长基因间非蛋白编码RNA 996; 细胞周期蛋白依赖性激酶抑制蛋白2A; 胃癌; 增殖; 凋亡; 迁移; 侵袭

核心提要: 长基因间非蛋白编码RNA 996在胃癌中发挥促癌作用, 敲降其表达能抑制胃癌细胞增殖、迁移与侵袭并促进凋亡; 其发挥功能可能与调节细胞周期蛋白依赖性激酶抑制蛋白2A表达有关。

文献来源: 程国雄, 刘明, 陈正伟, 叶巧萍. 长链非编码RNA LINC00996通过抑制CDKN2A促进胃癌进展. *世界华人消化杂志* 2024; 32(4): 302-312

URL: <https://www.wjgnet.com/1009-3079/full/v32/i4/302.htm>

DOI: <https://dx.doi.org/10.11569/wjcd.v32.i4.302>

0 引言

胃癌是常见的消化道恶性肿瘤^[1]。尽管临床治疗策略不断改善, 但大多数患者在确诊时已发生转移, 导致5年总生存期未明显延长^[2,3]。因此, 除了及早诊断和治疗外, 还需要进一步明确胃癌发生和转移的分子机制, 并采用靶向药物等手段阻断其发生和转移的信号通路以延长患者生存期^[4,5]。然而, 目前对影响胃癌发展及侵袭转移的关键靶点仍不清楚。

长链非编码RNA(long non-coding RNA, lncRNA)在癌症发展和转移中扮演重要角色^[6,7], 但它们类型、数量和作用机制多样, 目前大部分尚不清楚。因此有必要从众多胃癌细胞与正常组织中筛选出差异表达的功能性lncRNA, 并研究其调控细胞生物学行为的分子机制。长基因间非蛋白编码RNA 996(long intergenic non-protein coding RNA 996, LINC00996)为新近被鉴定的lncRNA, 定

位于7号染色体(7q36.1). 已有研究^[8-11]表明LINC00996在肺癌、结直肠癌和多发性骨髓瘤中下调表达, 具有抑制癌细胞的作用; 而在弥漫性大B细胞淋巴瘤、宫颈鳞状细胞癌、食管癌和急性髓系白血病中上调表达, 促进了癌细胞的生长. 然而, 在胃癌中LINC00996的表达及其生物学作用尚不清楚. 因此, 本研究分析了LINC00996在胃癌中的表达情况, 并探讨了其对于胃癌细胞增殖、凋亡、迁移和侵袭的影响以及潜在机制.

1 材料和方法

1.1 材料

1.1.1 临床组织样本收集: 经我院伦理委员会审批[批件号: 2020临审第(03-01)号]并获得患者知情同意书签署, 本研究收集了50例在2021-05/2023-05期间接受胃癌切除术的患者样本[包含胃癌组织和癌旁(距离癌浸润边缘5 cm)组织]. 所有标本均保存在-80 °C条件下.

1.1.2 细胞: 永生化胃上皮细胞GES和胃癌细胞系(SGC7901、NCI-N87, BGC-823)均购自武汉普诺赛生命科技有限公司.

1.1.3 主要试剂: RPMI-1640培养基和胎牛血清购自武汉尚恩生物技术有限公司; 针对LINC00996的小干扰RNA(si-LINC00996)、针对细胞周期蛋白依赖性激酶抑制蛋白2A(cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, CDKN2A)的小干扰RNA(si-CDKN2A)、阴性无关的小干扰RNA(si-NC)由北京六合华大基因科技有限公司合成; Trizol试剂购自北京百草泰克技术有限公司; InvitroRNA转染试剂购自南京英维沃生物科技有限公司; 逆转录试剂盒、RT-qPCR荧光定量试剂盒和细胞计数试剂盒-8(cell counting kit-8, CCK-8)细胞计数试剂盒购自上海经科化学科技有限公司; EDU-647细胞增殖检测试剂盒、细胞周期试剂盒、Annexin V-FITC细胞凋亡检测试剂盒、GAPDH抗体和HRP标记二抗购自上海碧云天生物技术有限公司; 周期蛋白D1(cyclin D1)、B淋巴细胞瘤-2(B-cell lymphoma-2, Bcl-2)、Bcl-2相关X蛋白(Bcl-2 associated X protein, Bax)和劈开的半胱氨酸蛋白酶-3(cleaved cysteinyl aspartate-specific proteinase-3, Cleaved caspase-3)抗体购自Santa Cruz公司; CDKN2A抗体购自美国Usbiological公司.

1.2 方法

1.2.1 生物信息学分析: 根据GEPIA数据库(<http://gepia.cancer-pku.cn/>)检索LINC00996在胃癌中的表达情况; 利用Kaplan Meier Plotter数据库(<https://kmplot.com/analysis/>)获取LINC00996表达对胃癌总生存期(overall survival, OS)的影响曲线图.

1.2.2 检测胃癌及癌旁组织、胃癌细胞及胃正常上皮细胞系中LINC00996表达: 根据说明书步骤, 用Trizol试剂

提取胃癌及癌旁组织、胃癌细胞及胃正常上皮细胞系中总RNA, 用超微量核酸蛋白检测仪测量总RNA纯度和浓度后, 各取1 μg总RNA用逆转录试剂盒合成总cDNA, 以cDNA为模板, U6为内参, 用RT-qPCR荧光定量试剂盒通过实时荧光定量PCR仪进行反应, 采用 $2^{-\Delta\Delta C_t}$ 方法计算出胃癌及癌旁组织、胃癌细胞及胃正常上皮细胞系中LINC00996表达量.

1.2.3 细胞培养及转染: 将人胃癌细胞(SGC7901和NCI-N87)置于含10%胎牛血清、100 U/mL青霉素和100 μg/mL链霉素的RPMI-1640培养液中, 之后将其放入培养箱(温度37 °C、5%CO₂)中进行培养, 每3 d更换1次培养液, 每日观察细胞生长状态, 密度达80%-90%时, 将培养基除去, 进行传代培养. 按照转染说明书步骤, 取生长状态良好的SGC7901和NCI-N87细胞, 分别稀释至 1×10^6 个细胞/mL后(无血清和无双抗的RPMI-1640培养液稀释), 接种于6孔板上, 每孔200 μL(1×10^6 个), 待细胞融合度达80%, 采用InvitroRNA转染试剂进行分别将si-NC、si-LINC00996、si-LINC00996+si-NC和si-LINC00996+si-CDKN2A转染至细胞内, 记为si-NC组、si-LINC00996组、si-LINC00996+si-NC组和si-LINC00996+si-CDKN2A组, 转染48 h后进行后续实验.

1.2.4 细胞增殖检测: 用CCK-8法和EDU渗入法评估细胞增殖. CCK-8检测步骤: 分别将各组细胞接种至96孔板(每孔5000个细胞), 培养48 h后, 加入CCK-8试剂(每孔10 μL)并37 °C孵育2 h, 用酶标仪检测各孔吸光度OD值, 细胞活性 = (实验组OD值/对照组OD值) × 100%. EDU渗入法步骤: 分别将各组细胞接种至96孔板(每孔5000个细胞), 加入EDU-647检测液(每孔10 μL)并37 °C孵育2 h, DAPI染核, 荧光显微镜下观察并计数EDU阳性细胞数.

1.2.5 细胞周期检测: 分别将各组细胞接种至6孔板(每孔 5×10^6 个细胞), 培养48 h后, 用无EDTA的0.2%胰酶消化, 1500 g离心5 min收集细胞, 用冷PBS洗涤2次, 用冷无水乙醇-20 °C固定过夜, 再用冷PBS洗涤2次, 加入0.2 mL PI溶液(50 μg/mL)室温避光孵育30 min, 流式细胞仪上机检测.

1.2.6 细胞凋亡检测: 分别将各组细胞接种至6孔板(每孔 5×10^6 个细胞), 培养48 h后, 用无EDTA的0.2%胰酶消化, 1500 g离心5 min收集细胞, 用冷PBS洗涤2次, 加入0.5 mL结合缓冲液制成细胞悬液, 加入5 μL Annexin V-FITC试剂和10 μL PI试剂(50 μg/mL)室温避光孵育10 min, 流式细胞仪上机检测.

1.2.7 划痕实验检测细胞迁移: 取各组细胞, 用无血清RPMI-1640培养液稀释成 1×10^5 个/mL的细胞悬液, 并接种于载玻片上, 待细胞成单层汇合时, 用大头针尾端划线, 继续培养48 h, 倒置显微镜下拍照划痕后0 h和48 h的细胞划痕宽度. 愈合距离 = 0 h细胞划痕宽度-48 h细胞




图 1 *LINC00996*在胃癌细胞系和组织中表达上调. A: GEPIA数据库分析显示胃癌组织中*LINC00996*表达高于正常胃黏膜组织, $P < 0.01$; B: Kaplan Meier Plotter数据库显示*LINC00996*高表达组的胃癌患者总生存期较表达低组明显缩短, $P = 0.016$; C: RT-qPCR分析胃癌组织和癌旁组织中*LINC00996*表达, $n = 50$, $^aP < 0.01$ vs 癌旁组织; D: RT-qPCR分析胃正常细胞系GES和胃癌细胞BGC-823、NCI-N87和SGC7901中*LINC00996*表达, $n = 3$, (bP , cP , dP) < 0.01 vs GES细胞.

划痕宽度, 细胞迁移 = (实验组愈合距离/对照组愈合距离) $\times 100\%$.

1.2.8 Transwell检测细胞侵袭: 用基质胶(1:8稀释)涂覆Transwell嵌套的聚酯纤维膜(0.8 μm 孔径), 待风干后, 将包被后的嵌套置于24孔板中. 取各组细胞, 用无血清RPMI-1640培养液稀释成 1×10^5 个/mL的细胞悬液, 取200 μL 细胞悬液加入嵌套中, 在下室加600 μL 含10%胎牛血清的RPMI-1640培养液, 37 $^{\circ}\text{C}$ 孵育24 h. 取出嵌套, 擦除聚酯纤维膜上层内的细胞, 用4%多聚甲醛固定细胞20 min, 0.1%结晶紫溶液染色15 min. 倒置显微镜下, 任选5个视野对细胞计数.

1.2.9 Western blot检测蛋白表达: 用细胞蛋白质裂解液萃取各组细胞总蛋白质, 对每组蛋白质样本定量后, 各取30 μg 蛋白质进行Western blot转印至PVDF膜上. 用5%脱脂奶粉对PVDF膜进行封闭后, 加Cleaved-caspase-3(1:1000)、cyclin D1(1:1000)、Bax(1:2000)、Bcl-2(1:1000)、CDKN2A(1:1000)和GAPDH(1:6000)抗体于摇床上室温孵育, 共孵育2 h, 用TBST洗膜3次, 5 min/次, 然后加HRP-二抗(1:2000)于摇床上室温孵育, 共孵育1 h, 用TBST洗膜3次, 10 min/次. 用ECL化学发光试剂显影, 以GAPDH为内参, 相对条带灰度光密度值采用Image J软

件分析.

统计学处理 采用SPSS 19.0统计软件进行分析处理. 计量资料采用均数 $\pm$ 标准差(mean $\pm$ SD)描述, 多组间比较采用单因素方差分析, 两组间比较采用独立样本 t 检验. $P < 0.05$ 为差异具有统计学意义.

2 结果

2.1 *LINC00996*在胃癌细胞系和组织中表达上调, 并与总生存率、淋巴结转移、TNM分期和淋巴血管侵袭有关 首先用GEPIA数据库获取*LINC00996*在胃癌组织($n = 408$ 例)和正常胃黏膜组织($n = 211$ 例)中的表达情况, 与正常胃黏膜组织比较, 胃癌组织中*LINC00996*表达显著上调($P < 0.01$), 见图1A. 用Kaplan Meier Plotter数据库分析*LINC00996*表达对胃癌患者OS的影响, 结果(图1B)显示, 以*LINC00996*表达量的中位值分为高表达组($n = 184$ 例)和低表达组($n = 89$ 例), 与低表达组比较, 高表达组的胃癌患者OS明显缩短($P = 0.016$). 通过RT-qPCR分析胃癌及癌旁组织、胃癌细胞及胃正常上皮细胞系中*LINC00996*表达(图1C和D), 与癌旁组织和胃正常上皮细胞系比较, 胃癌组织及胃癌细胞系中*LINC00996*表达均显著增高($P < 0.01$). 进一步分析了*LINC00996*表达与胃癌

表 1 LINC00996表达与50例胃癌患者临床病理特征的相关性(mean ± SD)

临床特征	例数(n)	LINC00996表达水平	t或F值	P
年龄(岁)			0.354	>0.05
<60	20	5.24 ± 0.85		
≥60	30	5.48 ± 1.04		
性别			0.689	>0.05
男	37	5.29 ± 1.21		
女	13	5.46 ± 1.38		
肿瘤大小(cm)			0.402	>0.05
<3	16	5.35 ± 1.02		
≥3	34	5.42 ± 1.44		
肿瘤部位			1.302	>0.05
上三分之一	16	5.12 ± 0.73		
中三分之一	11	5.42 ± 1.15		
下三分之一	23	5.34 ± 1.23		
浸润深度			5.324	<0.01
局限于浆膜下层	15	3.54 ± 0.56		
超过浆膜下层	35	6.21 ± 1.32		
淋巴结转移			6.793	<0.01
阴性	13	3.02 ± 0.63		
阳性	37	6.42 ± 1.53		
TNM分期			4.895	<0.01
I - II 期	19	3.74 ± 0.68		
III - IV 期	31	6.35 ± 1.42		
淋巴管血管侵袭			5.189	<0.01
阴性	32	4.02 ± 0.71		
阳性	18	7.76 ± 1.39		

患者临床病理特征的关系, 如表1所示, 在50例胃癌标本中, 有淋巴结转移、TNM(III-IV期)、淋巴管血管侵袭的胃癌组织中LINC00996表达水平显著高于无淋巴结转移、TNM(I - II期)、无淋巴管血管侵袭的胃癌组织($P<0.01$); 但LINC00996表达与性别、年龄、肿瘤部位和大小无关($P>0.05$).

2.2 敲降LINC00996抑制胃癌细胞增殖、细胞周期运行和迁移侵袭并促进细胞凋亡 用EDU染色和CCK-8法评估敲降LINC00996抑制胃癌细胞增殖的影响, 如图2A-F所示, 与si-NC组比较, si-LINC00996组SGC7901细胞(图2A-C)和NCI-N87细胞(图2D-F)的EDU阳性细胞数和细胞活力均显著下降($P<0.01$), 说明敲降LINC00996抑制胃癌细胞增殖. 进一步检测了敲降LINC00996对胃癌细胞周期的影响, 如图2G-J所示, 与si-NC组比较, si-LINC00996组SGC7901细胞(图2G和I)和NCI-N87细胞(图2H和J)的G1期比例明显增高($P<0.01$), S期比例明显降低($P<0.01$), 说明敲降LINC00996能使得胃癌细胞周期阻滞于G1期. 用划痕实验研究了敲降LINC00996对胃癌细胞迁移的影响, 如图3A-D所示, 与si-NC组比较, si-LINC00996组SGC7901细胞(图3A和B)和NCI-N87

细胞(图3C和D)的细胞迁移能力明显降低($P<0.01$). 用Transwell实验研究了敲降LINC00996对胃癌细胞侵袭的影响, 如图3E-H所示, 与si-NC组比较, si-LINC00996组SGC7901细胞(图3E和F)和NCI-N87细胞(图3G和H)的细胞侵袭能力明显降低($P<0.01$). 用流式细胞术法检测了敲降LINC00996对胃癌细胞凋亡的影响, 如图4所示, 与si-NC组比较, si-LINC00996组SGC7901细胞(图4A和B)和NCI-N87细胞(图4C和D)的细胞凋亡明显增高($P<0.01$).

2.3 敲降LINC00996对胃癌细胞中CDKN2A、cyclin D1、Bax、Bcl-2和Cleaved caspase-3表达的影响 用Western blot法检测敲降LINC00996抑制胃癌细胞中CDKN2A、cyclin D1、Bax、Bcl-2和Cleaved caspase-3表达的影响, 如图5所示, 与si-NC组比较, si-LINC00996组SGC7901细胞(图5A和B)和NCI-N87细胞(图5C和D)中均CDKN2A、Bax和Cleaved caspase-3表达显著上调($P<0.01$), 而cyclin D1和Bcl-2表达显著下调($P<0.01$).

2.4 敲降CDKN2A逆转敲降LINC00996对胃癌细胞的抗肿瘤效应 首先检测胃癌细胞增殖, 如图6A-F所示, 与si-LINC00996+si-NC组比较, si-LINC00996+si-CDKN2A组SGC7901细胞(图6A-C)和NCI-N87细胞(图6D-F)的




图 2 敲降LINC00996抑制胃癌细胞增殖。A-C: EDU染色(A和B)和CCK-8法(C)评估敲降LINC00996对SGC7901细胞增殖的影响, $n = 3$, ^a $P < 0.01$, ^b $P < 0.01$ vs si-NC组; D-F: EDU染色(D和E)和CCK-8法(F)评估敲降LINC00996对NCI-N87细胞增殖的影响, $n = 3$, ^a $P < 0.01$, ^b $P < 0.01$ vs si-NC组; G-J: 流式细胞术分析敲降LINC00996对SGC7901(G和I)和NCI-N87(H和J)细胞周期的影响, $n = 3$, ^a $P < 0.01$, ^b $P < 0.01$ vs si-NC组。




图 3 敲降LINC00996抑制胃癌细胞迁移与侵袭。A-D: 划痕法检测敲降LINC00996对SGC7901(A和B)和NCI-N87(C和D)细胞迁移的影响, $n = 3$, ^a $P < 0.01$, ^b $P < 0.01$ vs si-NC组; E-H: Transwell法检测敲降LINC00996对SGC7901(E和F)和NCI-N87(G和H)细胞侵袭的影响, $n = 3$, ^c $P < 0.01$, ^d $P < 0.01$ vs si-NC组。




图 4 敲降LINC00996诱导胃癌细胞凋亡. A-B: 流式细胞术法检测敲降LINC00996对SGC7901细胞凋亡的影响, $n = 3$, ^a $P < 0.01$ vs si-NC组; C-D: 流式细胞术法检测敲降LINC00996对NCI-N87细胞凋亡的影响, $n = 3$, ^b $P < 0.01$ vs si-NC组.




图 5 敲降LINC00996对胃癌细胞中CDKN2A、cyclin D1、Bax、Bcl-2和Cleaved caspase-3表达的影响. A-B: Western blot法检测敲降LINC00996对SGC7901细胞中CDKN2A、cyclin D1、Bax、Bcl-2和Cleaved caspase-3表达的影响, $n = 3$, (^a P , ^b P , ^c P , ^d P , ^e P) < 0.01 vs si-NC组; C-D: Western blot法检测敲降LINC00996对NCI-N87细胞中CDKN2A、cyclin D1、Bax、Bcl-2和Cleaved caspase-3表达的影响, $n = 3$, (^a P , ^b P , ^c P , ^d P , ^e P) < 0.01 vs si-NC组. CDKN2A: 细胞周期蛋白依赖性激酶抑制蛋白2A; cyclin D1: 周期蛋白D1; Bax: Bcl-2相关X蛋白; Bcl-2: B淋巴细胞瘤-2; Cleaved caspase-3: 劈开的半胱氨酸蛋白酶-3.




图 6 敲降CDKN2A逆转敲降LINC00996对胃癌细胞增殖的抑制作用. A-C: EDU染色(A和B)和CCK-8法(C)评估两组SGC7901细胞增殖, $n = 3$, $^aP < 0.01$, $^bP < 0.01$ vs si-LINC00996+si-NC组; D-F: EDU染色(D和E)和CCK-8法(F)评估两组NCI-N87细胞增殖, $n = 3$, $^aP < 0.01$, $^bP < 0.01$ vs si-LINC00996+si-NC组; G-J: 流式细胞术分析两组SGC7901(G和I)和NCI-N87(H和J)细胞周期, $n = 3$, $^aP < 0.01$, $^bP < 0.01$ vs si-LINC00996+si-NC组.

EDU阳性细胞数和细胞活力均显著增加($P < 0.01$), 说明敲降CDKN2A能逆转敲降LINC00996对胃癌细胞增殖的抑制作用. 细胞周期检测结果如图6G-J所示, 与si-LINC00996+si-NC组比较, si-LINC00996+si-CDKN2A组SGC7901细胞(图6G和I)和NCI-N87细胞(图6H和J)的G1期比例明显降低($P < 0.01$), S期比例明显增高($P < 0.01$). 细胞迁移和细胞侵袭检测结果如图7所示, 与si-LINC00996+si-NC组比较, si-LINC00996+si-CDKN2A组SGC7901细胞(图7A、7B、7E和7F)和NCI-N87细胞(图7C、7D、7G和7H)的细胞迁移和细胞侵袭能力明显增加($P < 0.01$). 细胞凋亡检测结果如图8所示, 与si-LINC00996+si-NC组比较, si-LINC00996+si-CDKN2A组SGC7901细胞(图8A和B)和NCI-N87细胞(图8C和D)的细胞凋亡明显降低($P < 0.01$).

2.5 敲降CDKN2A对胃癌细胞中CDKN2A、cyclin D1、Bax、Bcl-2和Cleaved caspase-3表达的影响 Western blot结果如图9所示, 与si-LINC00996+si-NC组比较, si-LINC00996+si-CDKN2A组SGC7901细胞(图9A和B)和

NCI-N87细胞(图9C和D)中均CDKN2A、Bax和Cleaved caspase-3表达显著下调($P < 0.01$), 而cyclin D1和Bcl-2表达显著上调($P < 0.01$).

3 讨论

探索影响胃癌进展的关键靶点有助于制定胃癌的生物靶向治疗策略^[12]. 本研究显示, LINC00996在胃癌中表达上调, 且其与淋巴结转移、TNM分期较高以及淋巴管血管侵袭有关; 进一步研究显示, 敲降LINC00996能抑制胃癌细胞增殖、迁移与侵袭; 这些结果说明LINC00996在胃癌发生促癌因子作用, 靶向敲降LINC00996表达可能是潜在的胃癌生物靶向治疗策略.

本研究进一步探讨了LINC00996在胃癌中发挥促癌因子作用的机制. 已有研究表明LINC00996是细胞周期调节节点P16(也称为CDKN2A)的调节性LncRNA^[13]. 本研究显示, 敲降LINC00996能上调胃癌细胞中CDKN2A的表达. 大量研究证实^[14-16], CDKN2A能与cyclin D1竞争性结合细胞周期蛋白依赖性激酶4, 使得视网膜母细胞




图 7 敲降CDKN2A逆转敲降LINC00996对胃癌细胞迁移与侵袭的抑制作用。A-D: 划痕法检测两组SGC7901(A和B)和NCI-N87(C和D)细胞迁移, $n = 3$, ^a $P < 0.01$, ^b $P < 0.01$ vs si-LINC00996+si-NC组; E-H: Transwell法检测两组SGC7901(E和F)和NCI-N87(G和H)细胞侵袭, $n = 3$, ^c $P < 0.01$, ^d $P < 0.01$ vs si-LINC00996+si-NC组。




图 8 敲降CDKN2A逆转敲降LINC00996诱导的胃癌细胞凋亡。A-B: 流式细胞术法检测两组SGC7901细胞凋亡, $n = 3$, ^a $P < 0.01$ vs si-LINC00996+si-NC组; C-D: 流式细胞术法检测敲降两组NCI-N87细胞凋亡, $n = 3$, ^b $P < 0.01$ vs si-LINC00996+si-NC组。

瘤蛋白磷酸化降低, 抑制细胞周期由G1期向S期转化, 导致细胞增殖降低。另外, 上调CDKN2A能抑制多种肿瘤细胞迁移与侵袭并诱导其凋亡^[17,18]。本研究结果也显示, 敲降LINC00996在上调CDKN2A的同时, 伴随着下调cyclin D1, 胃癌细胞G1期进入S期受阻和增殖受到抑制,

且抑制细胞迁移与侵袭, 同时胃癌细胞中Bax表达上调, 而Bcl-2表达下调, Caspase 3剪切, 细胞凋亡增多。拒此推测, 敲降LINC00996抑制胃癌细胞增殖、细胞周期运行、迁移和侵袭并促凋亡可能与上调CDKN2A表达有关。为证明这样假设, 本研究通过共转si-LINC00996+si-




图 9 si-LINC00996+si-NC组与si-LINC00996+si-CDKN2A组胃癌细胞中CDKN2A、cyclin D1、Bax、Bcl-2和Cleaved caspase-3表达情况。A-B: Western blot法检测两组SGC7901细胞中CDKN2A、cyclin D1、Bax、Bcl-2和Cleaved caspase-3表达, $n = 3$, (aP , bP , cP , dP , eP) <0.01 vs si-LINC00996+si-NC组; C-D: Western blot法检测两组NCI-N87细胞中CDKN2A、cyclin D1、Bax、Bcl-2和Cleaved caspase-3表达, $n = 3$, (aP , bP , cP , dP , eP) <0.01 vs si-LINC00996+si-NC组。CDKN2A: 细胞周期蛋白依赖性激酶抑制蛋白2A; cyclin D1: 周期蛋白D1; Bax: Bcl-2相关X蛋白; Bcl-2: B淋巴细胞瘤-2; Cleaved caspase-3: 劈开的半胱氨酸蛋白酶-3。

CDKN2A以下调CDKN2A表达, 结果说明下调CDKN2A能逆转敲降LINC00996对胃癌细胞的抗肿瘤效应, 提示LINC00996在胃癌中可通过调节CDKN2A发挥促癌作用。当然本研究依然存在一定的不足, 比如LINC00996是通过什么信号途径调节CDKN2A的表达的, 以及CDKN2A通过下游什么信号途径发挥生物学效应的; 另外, LINC00996是否还能通过其他信号途径在胃癌中发挥作用? 这些未知的信息仍需要大量研究来探索。

4 结论

综上所述, 本研究发现LINC00996在胃癌中表达上调, 且其表达量与淋巴结转移、TNM分期较高以及淋巴管血管侵袭有关, 敲降LINC00996能抑制胃癌细胞增殖、迁移与侵袭并促进凋亡, 另外敲降LINC00996的功能可能

与上调CDKN2A有关。另外, 本研究还提示LINC00996可能为胃癌的潜在分子靶标, 且敲降LINC00996可能为胃癌今后诊治的潜在策略。

文章亮点

实验背景

长链非编码RNA(long non-coding RNA, lncRNA)在肿瘤的发生和进展中发挥重要作用, 但其种类和数量繁多, 需要筛选和鉴别出功能性lncRNA, 并研究其调控肿瘤进展的作用机制。

实验动机

长基因间非蛋白编码RNA 996(long intergenic non-protein

coding RNA 996, LINC00996)是一种新近鉴定的lncRNA, 在多种肿瘤类型中具有抑制或促进癌症发展的功能, 而其在胃癌中的作用和机制尚不清楚。

实验目标

探索LINC00996在胃癌中的生物学功能及机制。

实验方法

通过生物信息学法和临床样本检测LINC00996在胃癌中表达, 用细胞学实验检测敲降LINC00996对胃癌细胞活性、增殖、细胞周期、凋亡、迁移与侵袭及凋亡相关蛋白的影响, 并分析其与细胞周期蛋白依赖性激酶抑制蛋白2A(cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, CDKN2A)的关系。

实验结果

LINC00996在胃癌中上调表达, 其与总生存期较短、淋巴结转移、TNM分期较高以及淋巴管血管侵袭有关。敲降其表达可能通过上调CDKN2A来发挥抑制胃癌细胞增殖、细胞周期运行、迁移与侵袭。

实验结论

LINC00996在胃癌中发挥促癌作用。

展望前景

LINC00996可能是胃癌诊断与不良预后的潜在标记物, 靶向LINC00996也可能是胃癌治疗的潜在策略。

5 参考文献

1 Smyth EC, Nilsson M, Grabsch HI, van Grieken NC, Lordick F. Gastric cancer. *Lancet* 2020; 396: 635-648 [PMID: 32861308 DOI: 10.1016/S0140-6736(20)31288-5]
2 Machlowska J, Baj J, Sitarz M, Maciejewski R, Sitarz R. Gastric Cancer: Epidemiology, Risk Factors, Classification, Genomic Characteristics and Treatment Strategies. *Int J Mol Sci* 2020; 21 [PMID: 32512697 DOI: 10.3390/ijms21114012]
3 Thrift AP, El-Serag HB. Burden of Gastric Cancer. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2020; 18: 534-542 [PMID: 31362118 DOI: 10.1016/j.cgh.2019.07.045]
4 Guan WL, He Y, Xu RH. Gastric cancer treatment: recent progress and future perspectives. *J Hematol Oncol* 2023; 16: 57 [PMID: 37245017 DOI: 10.1186/s13045-023-01451-3]
5 Zeng Y, Jin RU. Molecular pathogenesis, targeted therapies, and

future perspectives for gastric cancer. *Semin Cancer Biol* 2022; 86: 566-582 [PMID: 34933124 DOI: 10.1016/j.semcancer.2021.12.004]
6 布力布·吉力斯汉, 赛福丁·柯尤木, 刘春晖, 王培红. 长链非编码RNA核富集转录子1对胃癌SGC7901细胞迁移、侵袭、自噬的影响及机制研究. *陕西医学杂志* 2023; 52: 1749-1753 [DOI: 10.3969/j.issn.1000-7377.2023.12.027]
7 Xing C, Sun SG, Yue ZQ, Bai F. Role of lncRNA LUCAT1 in cancer. *Biomed Pharmacother* 2021; 134: 111158 [PMID: 33360049 DOI: 10.1016/j.biopha.2020.111158]
8 Shen Z, Li X, Hu Z, Yang Y, Yang Z, Li S, Zhou Y, Ma J, Li H, Liu X, Cai J, Pu L, Wang X, Huang Y. Linc00996 is a favorable prognostic factor in LUAD: Results from bioinformatics analysis and experimental validation. *Front Genet* 2022; 13: 932973 [PMID: 36118847 DOI: 10.3389/fgene.2022.932973.eCollection]
9 Ge H, Yan Y, Wu D, Huang Y, Tian F. Potential role of LINC00996 in colorectal cancer: a study based on data mining and bioinformatics. *Oncotargets Ther* 2018; 11: 4845-4855 [PMID: 30147336 DOI: 10.2147/OTT.S173225]
10 Zhou S, Fang J, Sun Y, Li H. Integrated Analysis of a Risk Score System Predicting Prognosis and a ceRNA Network for Differentially Expressed lncRNAs in Multiple Myeloma. *Front Genet* 2020; 11: 934 [PMID: 33193574 DOI: 10.3389/fgene.2020.00934]
11 Cai Z, Tang B, Chen L, Lei W. Mast cell marker gene signature in head and neck squamous cell carcinoma. *BMC Cancer* 2022; 22: 577 [PMID: 35610596 DOI: 10.1186/s12885-022-09673-3]
12 Park JY, Herrero R. Recent progress in gastric cancer prevention. *Best Pract Res Clin Gastroenterol* 2021; 50-51: 101733 [PMID: 33975687 DOI: 10.1016/j.bpg.2021.101733]
13 Zeng T, Jiang S, Wang Y, Sun G, Cao J, Hu D, Wang G, Liang X, Ding J, Du J. Identification and validation of a cellular senescence-related lncRNA signature for prognostic prediction in patients with multiple myeloma. *Cell Cycle* 2023; 22: 1434-1449 [PMID: 37227248 DOI: 10.1080/15384101.2023.2213926]
14 Knudsen ES, Kumarasamy V, Nambiar R, Pearson JD, Vail P, Rosenheck H, Wang J, Eng K, Bremner R, Schramek D, Rubin SM, Welm AL, Witkiewicz AK. CDK/cyclin dependencies define extreme cancer cell-cycle heterogeneity and collateral vulnerabilities. *Cell Rep* 2022; 38: 110448 [PMID: 35235778 DOI: 10.1016/j.celrep.2022.110448]
15 Safwan-Zaiter H, Wagner N, Wagner KD. P16INK4A-More Than a Senescence Marker. *Life (Basel)* 2022; 12: 1332 [PMID: 36143369 DOI: 10.3390/life12091332]
16 Knudsen ES, Witkiewicz AK, Rubin SM. Cancer takes many paths through G1/S. *Trends Cell Biol* 2023 [PMID: 37953123 DOI: 10.1016/j.tcb.2023.10.007]
17 Shi WK, Li YH, Bai XS, Lin GL. The Cell Cycle-Associated Protein CDKN2A May Promotes Colorectal Cancer Cell Metastasis by Inducing Epithelial-Mesenchymal Transition. *Front Oncol* 2022; 12: 834235 [PMID: 35311137 DOI: 10.3389/fonc.2022.834235]
18 Liu Y, Guo W, Hong SL. Aerobic exercise mitigates hippocampal neuronal apoptosis by regulating DAPK1/CDKN2A/REDD1/FoxO1/FasL signaling pathway in D-galactose-induced aging mice. *FASEB J* 2023; 37: e23205 [PMID: 37768886 DOI: 10.1096/fj.202300847RR]

科学编辑: 张砚梁 制作编辑: 张砚梁





Published by **Baishideng Publishing Group Inc**
7041 Koll Center Parkway, Suite 160, Pleasanton,
CA 94566, USA
Telephone: +1-925-3991568
E-mail: bpgoffice@wjgnet.com
https://www.wjgnet.com



ISSN 1009-3079

