

(위/대장 내시경) 검사 동의서

환자번호	진단명 : 위장질환
성명	진료과/담당교수 : 소화기내과 김윤래교수
성별/연령	의뢰의사 : 김인우
생년월일	환진요사 : (서명)
병동/병실	

■ 환자의 기용학 및 현재 상태

<ul style="list-style-type: none"> • 기 용 학 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/> 있음 • 특 미 체 질 <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 • 고 · 저 혈압 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/> 있음 • 상 경 질환 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/> 있음 • 두 약 사 고 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 • 호흡기 질환 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 • 구 체 속 내용 	<ul style="list-style-type: none"> • 불 쾌 륜 기 <input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 • 약 노 병 <input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/> 있음 • 출혈 수 인 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 • 신 장 결 핵 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 • 마 약 사 고 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 • 거 도 이 생 요 무 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음
---	---

■ 세부 내용 설명

설명항목	설명내용
1. 검사의 목적 및 효과(필요성, 안전)	<ul style="list-style-type: none"> • 위(내장)내시경 검사는 언제 내부를 관찰할 수 있는 내시경 기계의 이용 하여 위, 십이지장, 국장의 병변을 확인하기 위한 검사로서, 위(내장)내시경 검사 중 수검이므로, 국장 병변기 의심되는 병변이 있을 경우 직접 병변 관찰하고 병변의 조직을 채취하여 악성 병변 여부를 확인할 수 있는 장점이 있습니다.
2. 검사 과정 및 방법	<ul style="list-style-type: none"> • 위(내장)내시경 검사는 필(장노)를 통하여 식도, 위, 및 십이지장(十二指), 결장 및 맹장(대장)까지 관찰하게 하며 환자의 상태에 따라 필요 시 조직검사 및 여러 가지 수술을 시행할 수 있습니다. • 위(내장)내시경을 통한 조직검사는 내시경 검사를 받는 동안 위(내장) 내부에 병변이 관찰되는 경우, 내시경을 내부의 작은 병변을 통하여 조직검사를 위한 절개기 삽입의 후 작은 수검을 시행하는 과정을 거쳐 합니다. 이렇게 채취된 수검은 병변을 통한 조직 확인을 위하여 병부의 정확한 진단을 하게 합니다.
3. 검사과정 중 발생할 수 있는 문제점 (다처방전/검사관련 통증 및 병위 추가 가능성)	<ul style="list-style-type: none"> • 위(내장)내시경 검사는 일반적으로 안전한 검사이나 내시경 검사 시 두통이 발생이나 구토 구토의 경우 경미한 부작용이 있을 수 있으나 이러한 경우 대부분에서 약간의 안정과 시간 경과후 호전을 보입니다. 또한 드물게 위장 출혈이나, 전공, 저혈압 같은 심각한 부작용이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 의뢰진에 의해 추가적 치료를 시행하게 됩니다. • 위(내장)내시경 검사에 따른 조직검사는 병변에서 조직을 직접 채취하는 검사로서, 조직을 채취하는 과정에서 드물지만 조직검사 시행한 곳의 지속적인 출혈 또는 perforation, 천공, 전공은 위(내장)내시경에 발생할 수 있습니다. 지속적인 출혈이 있는 경우 조직 검사한 곳에 지혈제 투여 또는 주입, 출혈을 미흡한 지혈제 시행 할 수 있으며, 천공이 의심되는 경우는 병변에 이물질 삽입을 시행 할 수 있습니다. 내부장의 경우 위와 같은 시술을 통하여 문제가 해결이 되지만, 시술 후에도 출혈이 지속되거나 천공이 의심되는 경우 위(내장)내시경 병의 수술을 통한 치료를 필요할 수도 있습니다.